

参考文献

[1] Arief AI, Llach F, Massry SG. Neurological manifestations and morbidity of hyponatremia: correlation with

brain water and electrolytes. *Medicine (Baltimore)* 1976,55(2):121-129.

(收稿日期: 2007-09-19)

九华痔疮栓引起过敏性休克

任华丽 赵京莉 赵鸿芬 李小霞* (首都医科大学宣武医院风湿变态反应科,北京 100053)

摘要 1 例 28 岁混合痔和肛裂女性患者用九华痔疮栓治疗。用药约 3 min 后,患者出现颜面红疹发麻、口唇肿胀、恶心、呕吐、腹泻,头晕及意识模糊。患者 BP 为 60/40 mmHg,HR 120 次/min。经对症、支持治疗后,患者意识恢复,症状缓解。

关键词 九华痔疮栓; 过敏性休克

中图分类号: R 944.23 **文献标识码:** B **文章编号:** 1008-5734(2008)2-0151-01

Anaphylactic shock induced by *Jiuhuazhichuang* suppositories

Ren Huali, Zhao Jingli, Zhao Hongfen, Li Xiaoxia (Department of Rheumatology and Allergy, Xuanwu Hospital of Capital Medical University, Beijing 100053, China)

ABSTRACT A 28-year-old woman with mucocutaneous hemorrhoids and anal fissure received *Jiuhuazhichuang* suppositories. Three minutes later, she developed facial flushing with itching and numbness, swelling of the lips, nausea, vomiting, diarrhea, dizziness, and unconsciousness. Her blood pressure was 60/40 mmHg, her heart rate was 120 beats/min. After symptomatic and supportive therapy, she regained consciousness, and her symptoms were relieved.

KEY WORDS *Jiuhuazhichuang* suppositories; anaphylactic shock

患者女,28 岁。既往体健,于 2008 年 3 月 1 日因产后出现混合痔和肛裂 1 个月在药店自购九华痔疮栓外用治疗。用药约 3 min 时,患者出现颜面红痒、发麻、发胀,迅即出现口唇肿胀、外翻,无声嘶、无呼吸困难、无喘息,恶心、呕吐胃内容物 1 次,量约 100 ml,腹部绞痛,排黄色稀便 1 次量约 150 ml,继之出现头晕、意识模糊,迅速送至我院急诊。查体:T 36.6℃,P 120 次/min,R 26 次/min,BP 60/40 mmHg(1 mmHg = 0.133 kPa),神志淡漠,意识模糊,呼之能应,问答不语,颜面水肿,口唇明显肿胀外翻,呼吸略急促,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心音弱,心律齐,HR 120 次/min,腹平坦,轻度压痛,无反跳痛,肝脾未触及,移动性浊音阴性。双下肢不肿,肌力检查不能配合,生理反射存在,病理反射未引出。实验室检查:血常规、肝肾功能、血糖及电解质均在正常范围,患者无基础疾病,无其他药物应用史,发病时无其他可疑过敏原如食物或宠物接触,考虑为药物引起的过敏性休克。予 0.1% 的肾上腺素 0.3 ml 肌肉注射,苯海拉明 20 mg 肌肉注射、甲泼尼龙 40 mg 静脉滴注及补液、多巴胺升压等处理,约 30 min,患者意识恢复,问答自如,颜面红痒不适感消失,仍有轻度颜面胀满感,轻度头晕,未诉腹痛,查体神志清,问答切题,BP 120/80 mmHg,心音有力,心律齐,HR 89 次/min,颜面水肿较前明显减轻,腹部压痛消失,四肢肌力 V 级,1 h 后患者不适症状完全消失,约 6 h 后颜面水肿完全缓解离院。

讨论 患者既往无食物及药物过敏史,发病前无可疑常

见过敏原如食物、宠物、药物等接触史,无其他合并用药,此次应用九华痔疮栓约 3 min 即出现上述过敏性休克表现,发病与单一药物应用有明确的因果关系,考虑为该药引起的严重过敏反应,因其仍在哺乳期,出于安全性考虑,未行激发试验证实。

九华痔疮栓为消肿化瘀,生肌止血,清热止痛药物,用于各种类型的痔疮。主要成分为大黄、浙贝母、侧柏叶(炒)、厚朴、白芨、冰片。检索以往文献,未查到有关浙贝母、侧柏叶(炒)、厚朴、白芨引起过敏反应的报道,但有大黄片^[1]和冰片^[2,3]引起过敏的报道,尤其是冰片引起过敏的报道较多。冰片又名龙脑香,由龙脑香树脂加工制成,其过敏的表现多为局部瘙痒、肿痛、皮炎、全身风团,但目前尚未见有诱发过敏性休克的报道。本例提醒临床应用九华痔疮栓时应注意有引起严重过敏反应的可能性,使用前应询问患者过敏史,如有大黄或冰片过敏者应禁止使用。

参考文献

- [1] 田学增. 大黄片引起过敏性紫癜 1 例[J]. 中国中药杂志, 1994,19,(7):439.
- [2] 曲凤丽. 冰片外用致皮肤过敏反应一例[J]. 齐鲁药事, 2004,23(4):60.
- [3] 郭田秀,郭清风. 冰片引起过敏反应 1 例报道[J]. 中国民间疗法,2002,3(10):3.

(收稿日期: 2008-02-28)